

OLIVERA

- **MOSCA DE L'OLIVA**

El nivell de vol i de picades a les finques de control a tota la zona contínua sent en general de baixa a molt baix.

Tot i així es detecten unes finques, on durant tot aquest temps de seguiment han mostrat un nivell lleugerament superior de plaga, que en el control d'aquesta setmana esta pujant tant el vol com les picades, en aquests casos que s'està superant el llindar de tractament (de tenir més del 3 % d'olives picades noves si el producte té sols acció adulticida i més del 5% d'olives picades noves si el producte té acció adulticida i larvicida, amb el caolin seria a les primeres picades) s'haurien de protegir. Son finques amb oliva grossa i molt receptiva.

Per tant , en general no cal realitzar cap tractament , pero sí que es necessari que observeu les vostres plantacions per si es troben en la situació que es descriu anteriorment. Hi ha moltíssima irregularitat de mida de les olives i de receptivitat de les finques i cal per tant complementar aquestes seguiments amb els vostres a les pròpies finques.

Acció i terminis de seguretat

- Acció adulticida: deltametrin (7 dies) ,lambda cihalotrin (7/14 dies en funció del producte), Beauveria bassiana (NP), spinosad (7 dies), cyantraniliprol (7 dies),
- Acció adulticida i larvicida: Acetamiprid (28 dies), flupiradifurona (14 dies)
- Producte protecció física, evitant les picades: Caolin (NP). Tractament a les primeres picades.

Cal mirar el termini de seguretat del producte comercial.

El spinosad i el cyantraniliprol s'apli quen a bandes.

Es poden utilitzar en olivera ecològica: spinosad , Beauveria bassiana i Caolin

Se seguiran fent controls setmanals i ja s'avisarà si hi ha augments generals de la plaga.

- **ULL DE GALL,SABONOSA,ACTRANOSIS**

Tot i les darreres pluges i algunes humitats matinals les condicions per infeccions i desenvolupament important d'aquestes malalties no son altes. Sino canvien les condicions cap a més pluja , sols caldria protegir aquelles plantacions amb presència de malaltia i en llocs normalment més afectats (en el cas de l'ull de gall). Pels fongs que afecten al fruit protegir si hi ha canvis cap a més pluja. El canvi de color de les olives és un moment susceptible per aquests fongs que afecten al fruit.

PRODUCTES: Productes de coure registrats per aquest cultiu i malaltia, Dodina (TS 7 dies), Trifloxistrobin 50% (TS 14 dies)

TRACTAMENTS A LA CAIGUDA DE LA FULLA EN AMETLLER

Aquests tractaments tenen com a objectiu la reducció de la font de inòcul de les malalties, i es basa en fer 1 o 2 tractaments amb coure i en el primer d'ells barrejar-hi urea cristal·lina sense biuret per tal de degradar la fulla (25% i el 100% fulla caiguda).

Aquests tractaments cal dirigir-los a l'arbre i a les fulles del terra. Per algunes de les malalties que són freqüents a la nostra zona com és el cas de la **taca ocre** (*Polystigma amygdalinum*) i la **taca bacteriana** (*Xanthomonas arboricola*) és un tractament bàsic dins de les estratègies de control. La reducció d'inòcul es produeix també per altres fongs presents en aquest cultiu

VINYA

- **MOSQUIT VERD**

En vinyes joves en formació els hi produeix una forta parada i per tant es necessari en aquestes vinyes evitar al màxim aquest efecte ja que encara els hi queda molt temps per desenvolupar-se correctament. Si ho detecteu cal realitzar el seu control.

JORNADES , CURSOS ...

Si esteu interessats en que es realitzi alguna jornada, curs o alguna formació determinada mho comuniqueu, ja que ara es el moment de pensar-hi i programar-la.

Contacte ADV: advallsdelcorb@gmail.com

639344025