

OLIVERA

• MOSCA DE L'OLIVA

Aquesta setmana ha incrementat el nivell de plaga , tant el vol com les picades, a totes les finques que es fa el seu seguiment, les quals estan distribuïdes per tota la zona i se segueixen tant finques en secà com en reg.

Tot i així aquest increment no és homogeni a totes les finques, en unes es sobrepassa el nivell de tractament del 3%-5% de picada nova i en d'altres s'ha trobat un inici de picada nova. Hi ha moltíssima irregularitat de mida de les olives i de receptivitat de les finques i cal per tan complementar aquestes seguiments amb els vostres a les pròpies finques.

Per tant donada aquesta tendència observada de la plaga , cal protegir les plantacions si detecteu que supereu aquests llindars de tractament . Les finques amb olives grosses i amb tonalitats més grogues són les mes receptives a picades noves per la mosca .

Acció i terminis de seguretat:

- Acció adulticida: deltametrin (7 dies) ,lambda cihalotrin (7/14 dies en funció del producte), Beauveria bassiana (NP), spinosad (7 dies), cyantraniliprol (7 dies),
- Acció adulticida i larvicida: Acetamiprid (28 dies), flupiradifurona (14 dies)
- Producte protecció física, evitant les picades: Caolin (NP). Tractament a les primeres picades.

Cal mirar el termini de seguretat del producte comercial.

El spinosad i el cyantraniliprol s'apli quen a bandes.

Es poden utilitzar en olivera ecològica: spinosad , Beauveria bassiana i Caolin

• ULL DE GALL,SABONOSA,ACTRANOSIS

Les condicions de pluja (38-48 litres) i humitats que estem tenint són favorables a infeccions i desenvolupament d'aquestes malalties

PRODUCTES: Productes de coure registrats per aquest cultiu i malaltia, Dodina (TS 7 dies), Trifloxistrobin 50% (TS 14 dies)