

## VINYA

---

- **MILDIU**

De moment no es té constància de cap taca de míldiu a la zona. Donat que estem entrant en la floració (és el moment més susceptible a la malaltia) en algunes varietats i zones més primerenques i que és preveu una sèrie de pluges durant els propers dies, es recomana un tractament preventiu per aquestes vinyes que estan començant o la iniciaran d'immediat. Aquesta prevenció és més important en vinyes ecològiques, el tractament és a base de productes de coure. En vinyes no ecològiques que hi ha més possibilitats d'utilitzar diferents productes ( coures i contacte , penetrants, sistèmics ) més contundents alhora de parar la malaltia es pot fer igualment la seva protecció aquests dies i protegir la floració o be esperar si es manifesta la malaltia a la zona (primeres taques) i actuar llavors.

En zones i varietats més tardanes que encara no començarà la floració properament es pot esperar l'evolució de la meteorologia de la propera setmana.

Si localitzeu alguna taca no arrenqueu la fulla del cep i m'ho dieu, son vigents els premis a la localització de les primeres taques de míldiu. És molt important saber en quin moment apareixen i on per tal de planificar adequadament l'estratègia contra aquesta malaltia.

- **CENDROSA**

La floració és el l'altre moment preventiu a protegir. En vinyes normalment afectades ,no passar més de 2-3 setmanes entre el primer tractament dels 15 cm i el de la floració.

## OLIVERA

---

- **ULL DE GALL**

S'estan produint condicions adequades per aquest fong. Cal protegir els arbres especialment en aquelles zones o plantacions amb antecedents de la malaltia.

PRODUCTES: productes de coure registrats per aquest cultiu i malaltia, a part d'aquests productes o en barreja d'altres de contacte (folpet,...) que son preventius, existeixen altres productes més penetrants i sistèmics que son recomanables en finques amb important infestació d'aquesta malaltia: Azoxistrobin+difenoconazol, Difenoconazol, Dodina, Kresoxim-metil, Kresoxim-metil+difenoconazol, Piraclostrobin, Tebuconazol, Tebuconazol + oxiclورو de cobre, Tebuconazol+trifloxistrobin, trifloxistrobin

Cal comprovar per a cada producte comercial a utilitzar per aquesta malaltia: el numero de tractaments màxim per campanya i el moment fenològic permès

- **TUBERCULOSIS**

Protegiu aquestes plantacions durant els períodes de pluja i humitats amb productes de coure..

- **CUC (Phloeotribus scarabaeoides)**

Cal retirar les rames i troncs ( triturar, cremar ...) en el moment oportú abans no surtin els adults dels troncs.

- **CUC ( Hylesinus toranio )**

La sortida d'adults se sol produir al juny. Feu un tractament a principis i un a final de juny pel control dels adults abans no vagin a fer la posta a les branques. Els símptomes d'aquest cuc son unes taques fosques sota de les quals hi han els cucs que rossegueu, la rama posteriorment s'asseca. PRODUCTES: Lambda cihalotrin 10% ( formulat registrat per coleòpters).

## AMETLLER

---

- **TACA OCRE (*Polystigma amygdalium*)**

Ens trobem encara en un moment susceptible contra aquesta malaltia. Protegiu les plantacions de les condicions que s'estan produint.

PRODUCTES: Boscalida 26,7% +Piraclostrobin 6,7% WG (SIGNUM), Difenoconazol 25%EC (ESCORE 25ES,MAVITA 250EC), Difenoconazol 12,5%,Kresoxim-metil 25%WG (FLECHA SUPREM, SPOTTER WG).

Aquests productes tenen control contra d'altres fongs que afecten a l'ametller en aquests moments (cribat, arrufat...).

Vigileu el nombre màxim de tractaments que es poden fer per campanya amb un mateix producte fitosanitari o numero de registre.

- **TACA BACTERIANA (*Xanthomona arboricola*)**

A l'igual que en l'anterior malaltia cal que realitzeu la seva protecció especialment a les varietats més sensibles a aquesta malaltia. La seva afectació varia molt entre varietats i l'inòcul d'anys anteriors.

PRODUCTES: Productes de coure autoritzats per aquesta malaltia i cultiu i en aquest estadi fenològic d'aplicació.

- **PUGÓ (*Myzus persicae*)**

En algunes plantacions s'ha detectat presència d'algunes colònies.

Si en detecteu a les vostres plantacions, fer-ho abans no es cargolin massa les fulles

PRODUCTES: Acetamiprid 20%SG(GAZELPLUS),Deltamerin 1,57%SC, Deltamerin 2,5%EC Deltametrin 10%EC,Lambda cihalotrin 1,5%CS, Lambda cihalotrin 5%EG,Lambda cihalotrin 2,5%WG, Lambda cihalotrin 10%CS, Piretrines 4%EC, 4,65%EC, Spirotetramat 10%SC, Oli de parafina(54,6%EW)(79%EC i 83%EC),

## CEREALS

---

Fa uns dies es van detectar les primeres pústules de rovell en blat, no he observat un augment de la malaltia. Cal tenir en compte que les condicions climàtiques que estem tenint li son favorables. Vigileu les finques de blat en zones més altes i més endarrerides amb la vegetació susceptible a la malaltia .